

Le point capital est de bien établir les dessous.
on abaisse & on relève l'extrémité des bourgeons.
vase ramifié
sur trois branches (412-414)

Restauration.

- Distribuer la sève également dans toutes les branches – p^f cela entailles aux
- X branches les plus vigoureuses p^f détourner la sève – & on les palisse
complètement
- X – émousser. – enlever les têtes de saules. s'il y a des bourgeons on choisit le plus
rapproché de la base p^f le convertir en rameau à fruit - on comble
les vides avec des greffes de boutons de fruits – maintenir les prolongements
longs jusqu'à ce que la branche soit restaurée
- X - visiter les racines, mettre de la bonne terre
- La restauration des quenouilles porte sur les rameaux à fruits
p^f cela donner de la lumière, équilibrer
Le mieux est d'en faire des vases. p^f cela l'on change la te
incision annulaire
on coupe les branches en biseau & on
applique une greffe en couronne
- Lambourde de poirier négligée. (437). La sève a du mal à passer par
toutes ces ramifications p^f arriver jusqu'au fruit.
& il ne se forme sur ces lambourdes que des fruits
imparfaitement formés.
- X si on enlève toutes les lambourdes d'un seul coup, il se produit
des bourgeons en quantité.
- X Maladies nécroses, produites par les mauvais coups de sécateur (440) = portion de bois
mort enchâssé dans les parties vivants*
enlever & poser une greffe au sommet du biseau.
- bourrelet. produits sur les onglets laissés* par le sécateur
- X ulcère le frotter avec du jus d'oseille, souvent causée par la bêche qui a
blessé les racines
- gélivure – chlorose - langueur
rouille des feuilles – tigre. (454)
-