

Fièvre typhoïde. = Diothiésentérie.      trousseau clinique  
t 1<sup>er</sup>.

le caractère spécifique de la maladie c'est la lésion intestinale.

<sup>est</sup>  
cette éruption interne formée aux dépens des glandes agminées & isolées de Peyer  
elles se tuméfient, font saillie dans l'intestin. la tuméfaction va en augmentant  
jusqu'au 9<sup>e</sup> jour

le lieu d'élection est la dernière portion de l'iléon.

<sup>les tuméfactions</sup>  
cette entérite n'est qu'un élément de la maladie. ~~elles~~ n'en sont pas plus la cause  
que les éruptions ne sont la cause de la variole. qqfois elles manquent. elles sont toujours  
postérieures, aux développements symptomatiques de la fièvre. X (291)

X cela est un argument

p<sup>t</sup> les Vitalistes.

La gravité des symptômes généraux n'est pas en rapport avec l'intensité de l'éruption  
elle-même.

taches rosées lenticulaires -

qqques papules se montrent d'abord. Les jours suivants d'autres se développent à leur  
tour. Chaque tache considérée isolément dure de 3 à 15 jours, de telle sorte que celles qui  
ont apparu les premières s'éteignent lorsque de nouvelles commencent à se manifester  
la durée totale de l'éruption varie entre 3 & même 20 jours.

– Convalescence à surveiller. ~~les/a~~ possibilité du retour des accidents ~~peu~~ dangereuse  
taches bleues ou bleuâtres, se terminent heureusement

sous la forme adynamique administrez des stimulans, l'éther, l'ammoniaque – infusions de sauge  
de serpenteaire, de badiane. Vin de Malaga, limonades vineuses avec de l'eau de Seltz. (330)

<sup>tièdes</sup>  
affusions froides, bains. ou lotions avec de l'eau vinaigrée

X      Lorsque la surdité est des deux côtés, le pronostic est favorable.

qqfois hypertrophie de la rate comme dans la fièvre palustre.

Mais dans la fièvre putride l'engorgement de la rate arrive dès les premiers jours  
au point qu'elle doit atteindre, p<sup>t</sup> diminuer à mesure que la maladie fait des progrès  
tandis que dans la fièvre palustre c'est le contraire (339)

La fièvre typhoïde est contagieuse (342)

épidémie de typhoïde dans une ferme des Deux-Sèvres (3 fois en 40 ans) & chaque fois  
après la coupe d'un bois.

traitement. Trousseau n'ordonne que de l'infusion de camomille, des boissons acidules

X      La marche des fièvres éruptives est peu susceptible d'être modifiée par la médecine !  
(347)

Il faut les nourrir malgré la fièvre - pendant tout le cours de la maladie - potages  
maigres, qqques cueillerées de bouillon.

fragment de Graves (de Dublin) - 354/2. & sq.

Les personnes qui meurent d'inanition, ont une inflammation cérébrale.  
<sup>une inflammation</sup>  
vous ajoutez, par la diète, ~~cette inflammation~~ à la maladie, - ~~ou~~ tout ~~au moins~~ -  
gastrique ou cérébrale. Comme la sensibilité du malade est altérée, il ne demande  
pas d'aliments, mais il en a besoin –