Poirier

1ère anné. –

taille d'hiver. (1ère quinzaine de février)

supprimer le quart du prolongemt pr obtenir le développemt de tous les yeux de la base au sommet

X on doit tailler sur un œil placé de côté & avant – autremt (313) c'est …….

si on taille sur un œil ~~…~~ trop en dessus ou en dessous, on obtient des torsions

si les ramifications sont rapprochées, il faut en supprimer une partie –

Autremt elles absorberaient une partie de la sève

opérations d'été. état de l'arbre (317)

quand le bourgeon a développé 10 à 12 feuilles, on enlèvx 4 feuilles avec l'extrémité du bourgeon & on en laisse 8 sur le bourgeon. (on rompt avec les doigts). alors ce qui est en-dessous vient à fruit

X casser en vert, = laisser pendre les feuilles de l'extrémité cassée, hideux.

si on pince à 3 feuilles (323) la sève f/circonscrite fait développer trop de bourgeons – on

X coupe à l'épaisseur d'un écu (324) nécrose. qui ne va qu'en augmentant à chaque amputation

X s'abstenir de pincer les arbres nouvellemt plantés

le pincemt a pr but d'affaiblir les bourgeons pr leur faire obtenir des fleurs.

les pincemts courts, sont exécrables.

ébourgeonner = supprimer les bourgeons qui accompagnent celui du prolongemt (331-332)

fin de la 1ère anée (333)

2e anné

taille d'hiver

les rameaux faibles seront cassés à 5 ou 6 yeux.

quand les rameaux latéraux ont été cassés, on taille de nouveau le prolongemt de l'arbre et on repalisse

3e anné. tailler les rameaux à fruits sur le bouton le plus rapproché de sa base.

le bouton à fruit complètemt constitué ~~produit~~ prend le nom de lambourde

quand la lambourde a fleuri elle porte à l'extrémité une bourse qui a sa* à sa base des yeux.

X couper l'extrémité des bourses.

X si on laisse allonger le bourgeon qui naît sur la bourse, les rudims des boutons à fruits contenu dans les rides s'éteignent & la lambourde forme bientôt une branche tortue

Édition des dossiers de Bouvard et Pécuchet (http://www.dossiers-flaubert.fr), dir. S. Dord-Crouslé - © 2024 Tous droits réservés. 23-04-2024